




PRÉPARATION ET ADMINISTRATION DU VACCIN MODERNA®



POSOLOGIE



DÉCONGÉLATION AVANT DILLUTION

- **2h30** au réfrigérateur (**entre 2°C et 8°C**)
ou
- **1h00** à température ambiante (**entre 15°C et 25°C**)
- Etiqueter les flacons avec la date et l'heure de décongélation



CONSERVATION

- **Flacons non percés :**
30 jours dans le réfrigérateur (entre 2°C et 8°C) à l'abri de la lumière.
12h à température ambiante (entre 8°C et 25°C)
- **Flacons percés :**
19h à température ambiante ou au réfrigérateur à compter du soutirage de la 1ère dose.
- **Au delà, le produit doit être jeté.**



PRÉLÈVEMENT

■ **1 flacon = 10 doses.**

■ Avant chaque prélèvement, agiter doucement le flacon, en lui faisant décrire des cercles.
Ne pas secouer.

■ Prélever 0,5 ml (ou 0,25ml pour une dose de rappel) de vaccin avec une aiguille 23/25G montée sur une seringue de 1ml.

■ Inscrire l'heure d'expiration (+19h) sur le flacon percé et/ou sur les seringues. Jeter le produit passé ce délai.

■ Les 10 seringues peuvent être préparées en 1 fois et conservées à température ambiante ou au réfrigérateur.



INJECTION

■ Administration du vaccin par voie intramusculaire dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras.