

PRÉPARATION ET ADMINISTRATION DU VACCIN PFIZER® PÉDIATRIQUE



PRESCRIPTION

L'arrêté du 26 Janvier 2022 permet désormais aux professionnels de santé infirmiers libéraux de prescrire et administrer les vaccins pédiatriques contre la covid-19 aux enfants de 5 à 11 ans.



POSOLOGIE

La dose à administrer est la même **pour tout enfant entre 5 et 11 ans**, soit **0,2 ml de vaccin**.

Dose 1

Jour 1
0,2 ml
en intramusculaire



Dose 2


21 jours minimum après la 1ère dose ou une infection au covid
0,2 ml
en intramusculaire



DÉCONGÉLATION AVANT DILLUTION

Pour une boîte de 10 flacons : à une température de **2°C à 8°C pendant 4h**
ou

Pour un flacon : à une **température ambiante** (jusqu'à 30°C maximum) **pendant 30 minutes** (ne pas dépasser plus de 2h)



DILUTION

- Retourner le flacon délicatement à 10 reprises avant la dilution. Ne pas secouer
- Diluer le vaccin dans son flacon d'origine à l'aide de **1,3 ml** de solution injectable de **CHLORURE DE SODIUM à 0,9%**.
- Avant de retirer l'aiguille du bouchon du flacon, équilibrer la pression du flacon en **aspirant 1,3 mL d'air dans la seringue de diluant vide**.
- Retourner délicatement la solution diluée à 10 reprises. Ne pas secouer .
- Indiquer la date et l'heure de l'expiration de la solution diluée sur les flacons. (**+ 12 heures entre 2°C et 30°C**)



INJECTION

- **1 flacon = jusqu'à 10 doses.**
Prélever 1 dose de vaccin de 0,2 ml
Ne pas tapoter la seringue pour purger
- **Jeter** tout le flacon non utilisé, **12h après la dilution**.
- **Administration du vaccin par voie intramusculaire dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras.**



MESURES SPÉCIFIQUES AUX ENFANTS

- La présence d'au moins un parent accompagnateur est nécessaire à la vaccination de cette classe d'âge.
- Un formulaire d'autorisation parentale signé par au moins l'un des deux parents doit également être remis au professionnel de santé avant de procéder à la vaccination de l'enfant (cf pièce jointe)