

Poser les questions au patient en lui précisant que, pour répondre, il doit se resituer dans le temps qui précède, au mieux une semaine, et non pas dans la vie passée ou dans l'instant présent.

Vous sentez vous découragé(e) et triste ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Etes-vous heureux(se) la plupart du temps ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
<p>Cotation :</p> <p>Question 1 : oui : 1, non : 0</p> <p>Question 2 oui : 1, non : 0</p> <p>Question 3 oui : 0, non : 1</p> <p>Question 4 oui : 1, non : 0</p>		
<p>Si le score est supérieur ou égal à 1 : forte probabilité de dépression.</p> <p>Si le score est égal à 0 : forte probabilité d'absence de dépression.</p>		

Sources :

Yesavage JA: Geriatric depression scale. Psychopharm Bulletin 1988 ;24 :709 -710.

Clément JP, Nassif RF, Léger JM, Marchan F: Mise au point et contribution à la validation d'une version française brève de la Geriatric Depression Scale de Yesavage. L'Encéphale 1997; XXIII:91-99.